*Линзы для **контроля** детской близорукости*

ПРИЗНАКИ БЛИЗОРУКОСТИ

- Ребёнок нечётко видит вдаль
- Ребёнок жалуется на головную боль при зрительной нагрузке
- Снижается внимание, успехи в школе, в спорте
- Ребёнок прищуривается, чтобы видеть чётче
- Ребёнок слишком близко садится перед телевизором
- Возникают проблемы с поведением

КАК РАБОТАЕТ ЛИНЗА MYOSAFE™ PRO



- Центральная зона работает как обычная «минусовая» линза. Она даёт чёткое зрение прямо перед собой (вдаль).
- Дефокусная (лечебная) зона состоит из тысячи микролинз, которые создают «размытие» по периферии. Это уменьшает стимул для роста глазного яблока, что в свою очередь тормозит прогрессирование миопии.

*Линзы **MyoSafe™ PRO** замедляют прогрессирование миопии на **71.96%**.*[1]

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЛИНЗЫ MYOSAFE™ PRO

- Простой, современный метод контроля миопии
- Комфортное ношение и быстрая адаптация к очкам[2]
- Профилактика осложнений миопии
- Доступная цена и привлекательный внешний вид
- Безопасные линзы благодаря ударопрочному материалу
- Защита от ультрафиолета

ГАРАНТИЙНАЯ ПРОГРАММА

2 месяца
Гарантия на адаптацию
В случае неадаптации замена на пару однофокальных асферических линз Lencor™.

1 год
Гарантия на покрытие
Замена линз в случае расслоения покрытия (заводской брак).
Гарантия на материал
Замена линз в случае поломки, трещины на материале линзы.

6 и 12 месяцев
Гарантия на замедление прогрессирования миопии
Замена линз на аналогичные с данными нового рецепта. Подробности у консультантов оптики.

1. Эффективность линз MyoSafe™ PRO подтверждена клиническими исследованиями. В исследовании принимали участие 136 детей (272 глаза) с близорукостью в возрасте от 7 до 14 лет, которые случайным образом были разделены на три группы и носили линзы асферического дизайна (37 детей, 74 глаза), ассиметричный периферический дефокус (59 детей, 118 глаз) и микроструктурированные линзы (40 детей, 80 глаз). Офтальмологический центр Синофарм Дунфэн, г. Шиянь, Китай, больница общего профиля. Сентябрь 2022 – октябрь 2023г.

2. По данным анкетирования 184 детей время адаптации к очкам: несколько часов – 73 чел. (39,7%), 1 день – 43 чел. (23,4%), 3 дня – 44 чел. (23,9%), 1 неделя – 24 чел. (13%). Второе клиническое исследование очковых линз с микроструктурным дизайном для замедления прогрессирования миопии. Офтальмологическая больница при Медицинском университете Вэньчжоу, 31.03.2025г.